

Naturamin[®] Gold

ナチュラミン[®] ゴールド

作物がベタつかず、汚れにくい
高濃度アミノ酸粉末液肥

ナチュラミン[®]ゴールド


特長

- ① 約75%の高濃度でアミノ酸を含有！
- ② 水溶性で溶け残りが少ない！
点滴チューブでも使用可能！
＊ 点滴チューブの使用後は、カラ水を流してください。
- ③ 作物の汚れやベタつきが気にならない！
- ④ 保証成分（ N-P-K 11.5%-2%-1% ）

ナチュラミン[®]ゴールド

期待できる効果

高い発根促進効果による ストレスからの回復、
歩留まりの向上、なり疲れの軽減、着花促進 ほか



キャベツ定植から週1回、1,000倍で3回散布

ナチュラミン[®]ゴールド

使用方法

① 葉面散布:

1,000～2,000倍(100g/10aを目安に)


② 灌注処理:

100g/10a

※吸湿性が高いため、開封後は密封し、早めに使い切るようにしてください。
吸湿した場合にはベタつくことがあります、効果に影響はありません。


ナチュラミン[®]ゴールド

モモでの施用事例



- 処理期間 : 2025年6~7月
- 作物 : モモ・川中島白桃
- 場所 : 山梨県
- 処理方法 : 1,000倍液を2回葉面散布⁶
- 調査日 : 8月6日

果実の肥大、糖度の向上を確認！




ナチュラミン[®]ゴールド

ブドウでの施用事例

果実の肥大、糖度や着色の向上を確認！

調査結果




- 処理期間 : 2024年6~7月
- 調査日 : 8月23日
- 作物 : ブドウ・ピオーネ
- 場所 : 山口県
- 処理方法 : 1,000倍液を2回葉面散布
- 備考 : ナチュラミン区、無処理区の果実の大きさ、糖度などをそれぞれ調査。
調査は同樹齢の樹の枝太さが同等な箇所です5果連続×2枝にて実施。

ナチュラミン[®]ゴールド

キュウリでの施用事例

葉面温度の低下を確認！



※1) 供試作物はキュウリ(フリーダム露地1号)。
※2) 測定は、各散布日の翌日および3日後に行った。
※3) 子づるの活動中心葉10枚を測定した平均値。