

天然硫酸苦土肥料 **キーゼライト** (砂品) 水溶性苦土27%

■ 施用方法(果樹向け) 🍓


施用量：60kg/10a(15kg×4袋)

施用時期：収穫75日前

8月末収穫の場合、6月上旬の施用！

6月以降、果樹は果実肥大期に入ります。

キーゼライトの施用で果実品質向上！




■ なぜ果樹は苦土が重要なのか

山梨県の土壌は**苦土が不足傾向**です。(右図)
苦土欠乏症は果樹の開花期以降に出やすい傾向があります。

■ 苦土欠乏が起きると…光合成効率が落ちます。

その結果、果実重量が軽くなり、
糖度低下など果実品質にも影響します。



果樹は“果実肥大期”に苦土を多く必要とするため、

果実の肥大が始まる**収穫75日前の苦土の補給が効果的**です。

光合成効率を落とさないために、**速効+持続のキーゼライト**をお奨めします。

■ なぜ収穫75日前に施用するのか

キーゼライトは、速効性かつ長く効く特長があります。

約2か月半効果があり、果実肥大期に継続して苦土を効かせることができます。

(参考)マグネシウム欠乏条件下における巨峰の果実品質

	葉中Mg (%)	果房重 (g)	果粒重 (g)	糖度 (°Brix)
Mg欠乏区	0.049	149.6	8.7	17.7
完全区	0.374	244.0	10.2	21.4

Mg欠乏圃場では果房重、果粒重が振るわず、糖度も低下する傾向があります！