



温暖化に負けない!!
ぶどうの「着色向上」に!!

農林水産省登録 第24662号 有効成分:アブシシン酸10%

適用拡大のお知らせ(2025年3月12日)

「巨峰系4倍体」の
全ての品種でご使用いただける
ようになりました!



1本100mL

写真:クイーンニーナ

【適用表】(抜粋)

2025年3月12日現在

作物名	使用目的	希釈倍数	使用液量	使用方法	使用時期	本剤の使用回数
ぶどう (巨峰系4倍体品種)	着色促進	100~ 200倍	1果房あたり 2~10ml	果房散布	着色始期~ 着色開始2週間後	1回 アブシシン酸剤1回

【巨峰系4倍体品種の例】

巨峰、ピオーネ、クイーンニーナ、安芸クイーン、藤稰、サニールージュ
悟紅玉(ゴルビー)、紫玉、シナノスマイル、高妻、伊豆錦、オーロラブラック
オリンピア、高墨、ブラックオリンピア、紅伊豆、紅瑞宝、紅富士など

農林水産省「農薬の適用病虫害の範囲及び使用方法に係る適用農作物等の名称について」より抜粋・改編

【クイーンニーナでの着色比較】



実施年: 2022年
実施者: 兵庫県立
農林水産技術総合センター
試験樹: クイーンニーナ・5BB
9年生・一部被覆
処理日: 着色始期8/8
着色開始2週間後8/22
処理量: 5mL/果房
規模: 枝別5果房/区×3反復
収穫日: 9/15

2025年3月作成

- 使用前にはラベルをよく読んでください。
- ラベルの記載以外には使用しないでください。
- 小児の手の届く所には置かないでください。
- 空容器は圃場等に放置せずに適切に処理してください。



YouTube動画

← アブサップ液剤の
使用方法の動画はコチラ



農薬・肥料に関する
総合情報サイト【i-農力】や
各種SNSはこちら



住友化学

〒103-6020 東京都中央区日本橋2丁目7番1号

ご使用上の注意

1. 現在の登録(2025年3月)では
『巨峰系4倍体』品種にご使用いただけます。
・適用外の品種では絶対に使用しないでください。
2. 無散布の果実に比べ着色は先行して進みますが、
成熟に伴う食味向上は無散布の果実と同じスピードで進みます。
果実品質を必ずご確認の上、収穫してください。
・糖度が十分ではない果実の早出しは絶対に行わないでください。
3. 薬液が果粒に付き過ぎると
果面の汚れや果粉が溶脱するおそれがあります。
・細かい霧状、ミスト状で噴霧し、以下の写真の【適度】を目安に
薬液を果面に付着させることが望ましいです。

薬剤付着の目安

※13ml/房(適用外)



4. 着果過多や大房栽培で管理した場合、十分な効果が得られません。
・適切な栽培管理のもとご使用ください。
5. 散布後“カサかけ”や“袋掛け”をする場合、
果面がしっかり乾いたことを確認してから行ってください。
6. 薬剤に移行性がないため、房全体にムラなく散布してください。
7. 降雨の心配の無い日を選んで散布してください。
8. 果房周辺の葉は滴るほど被液しないようにご注意ください。
9. 本剤のご使用回数は1回のみです。